Data: 04.10.2019

Agricoltore Ticinese
Settimanale di cultura rurale

L'Agricoltore Ticinese
Via Gorelle, CP 447
6592 S. Antonino
091 851 90 90
www.agricoltore.ch

Genere di media: stampato
Tipo di media: stampa specializzata

Tiratura: 4'750
Uscita: settimanale
Rilascio: in abbonamento

Bollettino fitonsanitario numero 39

Monitoraggio *Drosophila suzukii* 2019

Novazzano, ciliegio



Drosophila suzukii: Aggiornamento
Le popolazioni di Drosophila suzukii (Ds) sono nuovamente in aumento, fatto dovuto essenzialmente a un andamento climatico favorevole al loro sviluppo. È quindi estremamente importante mantenere le parcelle contenenti frutti ancora in via di maturazione ben pulite da marciumi e da raccolti sovramaturi o danneggiati. Anche l'erba sotto i filari e attorno agli alberi dovrebbe essere tagliata regolarmente.

Da un rapido confronto tra le catture del 2018 e quelle di quest'anno, si nota che sia in agosto che in settembre le popolazione sono state più consistenti nel 2019.

Catture mensili a confronto: 2018-2019

Drosophila suzukii, Novazzano, ciliegio



	gennaio 2018	gennaio 2019	febbraio 2018	febbraio 2019	marzo 2018	marzo 2019	aprile 2018	aprile 2019	maggio 2018	maggio 2019	giugno 2018	giugno 2019	luglio 2018	luglio 2019	agosto 2018	agosto 2019	settembre 2018	settembre 2019
altri drosofilidi	59	329	33	226	87	773	586	1682	5272	4485	6318	4274	1631	908	971	559	1304	1008
maschi DS	57	108	5	2	10	31	20	65	28	46	206	29	898	664	1544	1819	1951	2466
femmine DS	80	189	13	19	2	110	38	290	4	146	114	46	601	506	780	919	1658	1836

La cimice asiatica bussa alle nostre porte

Fortunatamente le cimici asiatiche (*Halyomorpha halys, Hh*) non provocano malattie e non pungono l'uomo, ma sono comunque causa di ingenti danni in agricoltura. Inoltre possono recare fastidi e disagi nel periodo autunnale poiché, con i primi freddi infatti, gli adulti di Hh cercano riparo e calore negli spazi chiusi, in particolare negli stipiti e negli anfratti di porte e finestre. Proprio in questo periodo, in concomitanza con la raccolta di diverse colture di pieno campo, si sta assistendo a un esodo importante di queste cimici verso capanni e abitazioni. Ricordiamo a chi è confrontato con una presenza massiccia di questi insetti che può ricorrere a una disinfezione professionale.

Nei casi meno gravi, molti rimedi "casalinghi" risultano estremamente efficaci, in particolare per giardini e abitazioni private. Tra questi, rimane molto attuale la lotta meccanica effettuata con la cattura massale e l'eliminazione manuale degli insetti, che possono essere raccolti in contenitori con una soluzione di acqua e sapone, con successivo smaltimento attraverso i Rifiuti Urbani Liquidi. Anche l'utilizzo di zanzariere come barriere meccaniche sarà efficace, specialmente nelle abitazioni con infissi datati o di legno.

Per maggiori informazioni o eventuali segnalazioni potete rivolgervi allo 091 814 35 85. Grazie anticipatamente per le vostre segnalazioni.

La potatura dei platani deve aspettare fino alla completa caduta delle foglie

Ricordiamo nuovamente agli operatori del verde professionisti e ai privati che la potatura in generale rappresenta un trauma per l'albero, tanto maggiore quanto maggiore è l'entità della potatura stessa, con possibili conseguenze in termini di salute e di stabilità futura. Questa considerazione è ancora più vera per il platano, che può essere colpito da una malattia fungina di quarantena, il cancro colorato (*Ceratocystis platani, Cp*). Visto che le ferite prodotte dal taglio costituiscono una via di ingresso preferenziale per i patogeni, alcuni interventi mal gestiti possono trasformarsi in vere e proprie epidemie. Per questa ragione, e per evitare la propagazione del Cp, la potatura è consentita solo durate il riposo vegetativo, e più precisamente tra la fine caduta foglie e l'inizio apertura gemme con tempo asciutto e non ventoso.

Invitiamo tutti gli interessati a leggere le nostre nuove direttive scaricabili dal nostro sito oppure sul FU 076 del 20.09.2019.