



Servizio fitosanitario cantonale

Viale Stefano Franscini 17

6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 57/85/86/87

Fax: 091 / 814 81 65

Risponditore: non in funzione

Servizio.fitosanitario@ti.ch

www.ti.ch/fitosanitario

Bollettino fitosanitario n: 6

Bellinzona: 24 febbraio 2020

ORNAMENTALI

POTATURE DEL PLATANO: LE PIANTE SONO IN LINFA, ULTIMI INTERVENTI POSSIBILI

Il caldo primaverile che stiamo vivendo in queste settimane durante il giorno, ha già risvegliato molte piante dal loro riposo vegetativo, riattivando tutta una serie di funzioni vitali che permetteranno il loro germogliamento.

È noto che il riposo vegetativo è anche quello migliore per effettuare le potature in quanto:

- la pianta subisce uno shock minore perché possiede un minor quantitativo di liquidi in circolo,
- la ferite dei tagli possono cicatrizzare meglio approfittando della vigorosa ripresa primaverile,
- l'assenza delle foglie consente inoltre di individuare meglio i rami degli alberi su cui effettuare le operazioni di potatura, e la potatura può avvenire con maggiore precisione,
- l'assenza di patogeni attivi dovuta alle basse temperature aiuta ad evitare infezioni batteriche e fungine.

Quest'ultimo punto è particolarmente vero per quanto riguarda il platano che, soggetto al Cancro Colorato (malattia di quarantena sottoposta a lotta obbligatoria, vedere link sul nostro sito: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/fito/cancro_platano_decisione_20190301.pdf) se la potatura viene eseguita quando la pianta è già, o è ancora in linfa, di fatto si favorisce la diffusione



del fungo, sempre che l'inoculo è presente. In effetti, una delle vie possibili per il contagio è proprio la trasmissione da pianta infetta a pianta proprio malata tramite la potatura, se gli attrezzi utilizzati non vengono accuratamente disinfettati. Inoltre, essendo in linfa, l'inoculo viene trasportato fino alle ferite aperte, da dove il patogeno è libero di diffondersi.

In inverno invece le piante (sia conifere che latifoglie) si trovano in una fase di stasi, rendendo il numero dei potenziali portatori di attacchi e quindi il rischio del verificarsi di infestazioni o infezioni basso.

L'inverno rappresenta quindi il periodo ottimale in cui operare interventi di taglio sugli alberi, specie quelli di una certa entità. A partire dalla primavera fino all'autunno potare significa indebolire l'albero e renderlo più suscettibile alle malattie. D'altro canto è vero anche che l'inverno è sempre più corto e organizzarsi non è sempre facile. Per tanto consigliamo di effettuare tutti gli interventi di potatura sui platani **entro metà marzo**.

Ricordiamo che tutte le operazioni di recisione radicale e gli abbattimenti di platani, sia in zone indenni che zone focolaio, così come le potature in zone focolaio, devono essere notificate al Servizio fitosanitario cantonale e devono essere eseguite seguendo le procedure previste dalla direttiva riguardante il cancro colorato del platano.

Per ulteriori informazioni: www.ti.ch/fitosanitario oppure telefonando o scrivendo al nostro Servizio.