

Genere di media: stampato  
Tipo di: stampa specializzata

Tiratura: 4'772  
Uscita: settimanale  
Rilascio: in abbonamento

La difesa delle colture

Servizio fitosanitario

## Bollettino fitosanitario numero 6

### Generale:

#### Coleottero giapponese (Popillia japonica).

#### Schede informative e spostamento di terra

Nel corso del 2020 si è riscontrato un aumento delle catture di coleottero giapponese (in seguito Pj), in particolare nel sud del Ticino. Visto il concreto rischio che questo pericoloso insetto si propaghi e considerata la probabilità che alcune popolazioni si siano insediate nel territorio cantonale, la Confederazione, tramite l'Ufficio federale dell'agricoltura, ha emanato nuove misure di contenimento per impedirne la diffusione: "Decisione generale concernente misure urgenti per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino", pubblicata sul Foglio federale del 1 dicembre 2020 e consultabile al link: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2490/it>.

Tali misure non regolano solamente lo spostamento del materiale vegetale, del compost e delle piante, ma anche dei primi 30 centimetri di suolo derivanti da attività di scavo sia nella zona infestata che in quella cuscinetto.

In generale è vietato trasportare la terra al di fuori della zona infestata e dalla zona cuscinetto alla zona indenne. Derghe sono concesse tra il 1° ottobre e il 31 maggio dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo per il trasporto in discarica e l'interramento a 2 metri di profondità oppure dal nostro Servizio fornendo un'analisi del suolo che conferma l'assenza di larve di Pj. Per eseguire tali analisi lo scorso mese sono state formate delle ditte specializzate (riconosciute dalla Confederazione), la cui lista può essere consultata al link: [www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario), nella sezione "Guide e schede tecniche", "Insetti". La lista può essere richiesta anche in forma cartacea presso il nostro Servizio. Ricordiamo che queste analisi possono venir effettuate dal 15 settembre al 31 marzo, periodo in cui le larve di Pj sono facilmente reperibili nel terreno. Inoltre, allo stesso link, sono disponibili tutte le schede informative su Pj e la delimitazione delle zone in funzione della presenza dell'insetto per la stagione 2021.

