

Genere di media: stampato
 Tipo di: stampa specializzata

Tiratura: 5'300
 Uscita: settimanale
 Rilascio: in abbonamento

La difesa delle colture Servizio fitosanitario

Bollettino fitosanitario numero 8

Fenologia di alcune piante rilevanti in agricoltura



Albicocco, Leliet, Sant'Antonino, 06.03.2023
Stadio G1, inizio fioritura



Pescio, Mario Delirio, Sant'Antonino 20.02.2023
Stadio D, comparsa petali



Cilegio, Regino, Sant'Antonino, 06.03.2023
Stadio B, rigonfiamento gemme



Pera, William, Sant'Antonino 06.03.2023
Stadio A, gemme d'inverno



Melo, Golden, Sant'Antonino, 06.03.2023
Stadio C, apertura gemme



Prugno, President, Sant'Antonino, 06.03.2023
Stadio B, rigonfiamento gemme



Viticultura

Cocciniglia nera della vite

La cocciniglia nera della vite (*Targionia vitis* Sign.), appartiene alla famiglia dei Diaspididi. È presente in Italia, Francia, Germania, Penisola Iberica, parte della Penisola Balcanica, Ucraina e nella parte sud-occidentale della Russia. Fino ad oggi in Svizzera non è stata segnalata la sua presenza.

È ritenuto un parassita di importanza secondaria che solo in caso di grosse infestazioni può determinare un deperimento generale della pianta, una riduzione della vigoria vegetativa e una riduzione della produzione. *T. vitis* compie una sola generazione all'anno e sverna generalmente come femmina adulta fecondata. In primavera le forme giovanili (neanidi) che fuoriescono dagli adulti vanno a fissarsi nelle anfrattuosità del ritidoma del fusto (parte esterna della corteccia), sui tralci giovani e sui germogli dell'anno. È una cocciniglia molto piccola. Gli adulti raggiungono i 2 mm di grandezza e sono di colore bruno-violaceo, molto simile al colore del ritidoma. Le esuvie delle forme giovanili sono nere o nero-rossastre. Per questo motivo non sono facilmente individuabili. Spesso si distribuiscono in colonie, più visibili. Oltre alla vite può infestare diverse specie forestali come querce, faggio, platano, castagno e salice. Nel mese di febbraio, nel Bellinzonese è stata riscontrata su vite un'infestazione di una cocciniglia




apparentemente riconducibile a *T. vitis*. Al momento non è stato possibile eseguire una determinazione certa per la mancanza di femmine adulte. Invitiamo i viticoltori che dovessero riscontrare la presenza di cocciniglie con caratteristiche simili a quelle di *T. vitis* a contattare il Servizio fitosanitario cantonale.