

Danni della grandine nel Mendrisiotto: misure da adottare in vigneto

La sera del 9 giugno 2026 un violento temporale accompagnato da grandine, localmente anche di grandi dimensioni, ha colpito il Mendrisiotto, causando danni significativi ai vigneti. Nelle aree maggiormente interessate (le zone Gorla e Muscino a Castel San Pietro, alcune zone di Coldrerio e di Morbio Inferiore) i danni risultano gravi anche nei vigneti dotati di reti antigrandine. Le lesioni più importanti hanno interessato i germogli, in fase di crescita, che risultano in molti casi parzialmente o completamente defogliati. Anche i grappoli hanno subito danni, la cui entità risulta tuttavia ancora difficile da quantificare con precisione.

Misure da adottare nei vigneti colpiti

- ✓ Si raccomanda di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, ovvero in presenza di tempo stabile, assenza di vento e buona asciugatura della vegetazione residua.
- ✓ Per il trattamento è consigliabile utilizzare i prodotti già previsti dal programma fitosanitario. Nei vigneti in cui la parete vegetativa è stata gravemente compromessa, è possibile ridurre moderatamente i dosaggi dei prodotti (indicativamente all'80% della dose abituale). Dove i danni sono limitati, si raccomanda invece di mantenere i dosaggi normalmente previsti.
- ✓ Laddove i germogli sono stati piegati o abbattuti dall'evento e non presentino più un portamento verticale, si rende necessario riposizionare la vegetazione.
- ✓ Si consiglia di evitare interventi di potatura o tagli sulla vegetazione residua e di attendere la ripresa vegetativa della pianta. Nelle prossime settimane le gemme pronte presenti sui germogli superstiti daranno origine a nuove femminelle. Sarà pertanto importante prestare particolare attenzione alla ricostituzione dei germogli destinati alla produzione dell'anno successivo e di quelli necessari al mantenimento della struttura della pianta, in particolare i germogli derivanti dagli speroni di riserva.
- ✓ Con la ripresa della crescita vegetativa sarà fondamentale garantire un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni.
- ✓ Qualora necessario, una volta ricostituita una sufficiente superficie fogliare potrà essere valutato l'impiego di biostimolanti a sostegno della ripresa vegetativa.
- ✓ Si rende attenti che la nuova vegetazione sarà particolarmente attrattiva per lo scarabeo giapponese. Si raccomanda pertanto di monitorare attentamente la presenza del fitofago e, se necessario, di intervenire tempestivamente con le misure di lotta indicate dal Servizio fitosanitario cantonale.
- ✓ Nei vigneti maggiormente colpiti si raccomanda infine di monitorare attentamente

l'evoluzione sanitaria della vegetazione e dei grappoli nelle settimane successive all'evento, al fine di adeguare tempestivamente la strategia di protezione e accompagnare nel migliore dei modi la ripresa vegetativa delle piante.

Ufficio della consulenza agricola